

Procedimiento de recolección para análisis de semen

(Siga todas las instrucciones para asegurarse la recolección correcta de la muestra)

Para las pruebas:

703640 Análisis completo del semen

901289 Análisis del semen post-vasectomía con reflejo para contar/motilidad

Por favor sig alas siguientes instrucciones

Se require sacar cita. Visite www.SonoraQuest.com o llame al 1-855-367-2778 y pida una cita en uno de los siguientes Centros de Atención al Paciente:

Tempe: 1275 W. Washington Street, Suite 109, Tempe, AZ 85281

Tucson: 630 N Alvernon Way, Suite 200, Tucson, AZ 85771

Procedimiento de recolección:

1. La muestra de semen debe tomarse después de 2 a 7 días de abstinencia sexual salvo que su medico indique lo contrario.
2. La muestra debe tomarse en uno de los Centros de Atención al Paciente que se mencionan más arriba.
3. Junte toda la muestra mediante la masturbación en un recipiente estéril (el laboratorio suministra los recipientes). Debido a
4. que el volumen del semen producido puede ser significativo para el diagnóstico, es importante entregar toda la muestra. Asegúrese de que la tapa del recipiente esté bien cerrada.
5. Etiquete el recipient con su nombre, la fecha y la hora exacta de la muestra.

La información a continuación es necesaria para evaluar correctam ente los resultados de la prueba. Si tiene dudas sobre cómo o responder las preguntas, consulte a su m edico o a un em pleado de Sonora Quest Laboratories.

1. Nro. De días de abstinencia (días desde la última eyaculación): _____
2. Método de recolección Masturbación: _____ (requerida)

Para las pruebas:

3645 Análisis del semen post-vasectomía

900865 Análisis del semen, post-vasectomía con reflejo para contar

Por favor sig alas siguientes instrucciones: Procedimiento de recolección:

1. NO se require cita previa.
2. La muestra de semen debe tomarse después de 2 a 7 días de abstinencia sexual salvo que su medico indique lo contrario.
3. Junte la muestra en su casa y entréguela a cualquier Centro de Atención al Paciente de Sonora Quest Laboratories dentro de las 24 horas de haberla tomado (únicamente de Lunes a Viernes). Mantenga la muestra a una temperature cercana a la corporal (25°C-40°C or 77°F - 104°F).
4. Junte toda la muestra mediante la masturbación en un recipiente estéril (el laboratorio suministra los recipientes). No se aceptan las muestras en un condón o tomadas por coito interrumpido. Debido a que el volumen del semen producido puede ser significativo para el diagnóstico, es importante entregar toda la muestra. Asegúrese de que la tapa del recipient esté bien cerrada.

Etiquete el recipient con su nombre, la fecha y la hora exacta de la muestra.